

10 Signos de advertencia de la Inmunodeficiencia primaria en los adultos

La inmunodeficiencia primaria (primary immune deficiency, PI) hace que niños y adultos sufran infecciones que reaparecen frecuentemente o son muy difíciles de curar. Una de cada 500 personas sufre alguna de las inmunodeficiencias primarias conocidas. Si usted o alguien que conoce presentan dos o más de los signos de advertencia siguientes, consulte a su médico sobre la posible presencia de una inmunodeficiencia primaria subyacente.

- 1 Dos o más infecciones nuevas del oído en 1 año.
- 2 Dos o más infecciones graves de los senos paranasales en 1 año, en ausencia de alergias.
- 3 Una neumonía anual por más de 1 año.
- 4 Diarrea crónica con pérdida de peso.
- 5 Infecciones virales recurrentes (catarros, herpes, verrugas, condiloma).
- 6 Necesidad recurrente de antibióticos intravenosos para combatir las infecciones.
- 7 Abscesos profundos recurrentes en la piel o en órganos internos.
- 8 Aftas bucales o infecciones por hongos persistentes en la piel u otras partes.
- 9 Infecciones por bacterias del tipo de la tuberculosis que normalmente no causan infecciones.
- 10 Antecedentes familiares de PI.

www.ImmuneDisease.com

These La elaboración de estos signos de advertencia se debe al Consejo Asesor Médico de la Jeffrey Modell Foundation. Se recomienda ampliamente consultar a expertos en inmunodeficiencia primaria.

Si desea obtener más información o referencias de especialistas, póngase en contacto con la Jeffrey Modell Foundation al teléfono 866-INFO-4-PI o visite el sitio web info4pi.org.