

# 10 Signos de advertencia de la Inmunodeficiencia primaria en los niños

La inmunodeficiencia primaria (primary immune deficiency, PI) hace que niños y adultos sufran infecciones que reaparecen frecuentemente o son muy difíciles de curar. Una de cada 500 personas sufre alguna de las inmunodeficiencias primarias conocidas. Si usted o alguien que conoce presentan dos o más de los signos de advertencia siguientes, consulte a su médico sobre la posible presencia de una inmunodeficiencia primaria subyacente.

- 1 Cuatro o más infecciones nuevas del oído en 1 año.
- 2 Dos o más infecciones graves de los senos paranasales en 1 año.
- 3 Dos o más meses de tratamiento con antibióticos que tienen efecto mínimo.
- 4 Dos o más neumonías en 1 año.
- 5 Que un lactante no aumente de peso o no crezca de modo normal.
- 6 Abscesos recurrentes en las capas profundas de la piel o en otros órganos.
- 7 Aftas bucales o infecciones por hongos cutáneas persistentes.
- 8 Necesidad de antibióticos intravenosos para combatir las infecciones.
- 9 Dos o más infecciones arraigadas profundamente, como la septicemia.
- 10 Antecedentes familiares de PI.

[www.ImmuneDisease.com](http://www.ImmuneDisease.com)

These La elaboración de estos signos de advertencia se debe al Consejo Asesor Médico de la Jeffrey Modell Foundation. Se recomienda ampliamente consultar a expertos en inmunodeficiencia primaria.

Si desea obtener más información o referencias de especialistas, póngase en contacto con la Jeffrey Modell Foundation al teléfono 866-INFO-4-PI o visite el sitio web [info4pi.org](http://info4pi.org).